



Leut og skiljant  
lyng i <sup>18</sup>trædars.

436. 187  
J. 6/10  
Jen





636.089

Jen

**Stutt og skiljanleg lýsing  
fjárkláðans** og meðferðarinnar á hon-  
um; samín af dýralæknunum C. Jensen,  
I. Th. Hansteen og T. Finnbogasyni.

---

Áður enn vèr sèrstaklega útlistum meðferð  
fjárkláðans, þykir oss hæfa, að fara nokkr-  
um orðum um hann yfir höfuð.

Kláði telst meðal hinna lángvinnu hör-  
unds veikinda, sem brunasótt ekki fylgir,  
og orsakast af tímgun maurs þess, sem hon-  
um er eiginlegur (kláðalús), er aðskilur hann  
frá mörgum hörundaveikindum, sem fyrrum  
hefir verið slengt saman við hann. Öll hús-  
dýr vor eru undirorpin kláða, og hjá sèr-  
hverri tegund þeirra finnast kláðalús, sem  
henni út af fyrir sig er eiginleg, og elur  
sýkina til fullnustu einúngis á henni, en

sýkin batnar þá allsjaldan af sjálfu sér. Stöðug væta og saaggi, vond og óhrein hús, slæmt fæður, fæðurskortur, eða með öðrum orðum, vondt viðurværi og meðferð yfir höfuð hjálpa til að kveikja kláðalúsina. Þegar hún á annað borð er kviknuð, æxlar hún kyn sitt mikið fljótt og leggur eggjum, en viðkoman er fjarska mikil, og getur hún nú fluttst af einni skepna á aðra, og þannig komið útbreiðslu sýkinnar af stað. Kláðalúsir verkar fiðring í hörundinu en fiðringurinn leiðir út úr því vessa líkan eggjahvítu, og myndast hér af bólur, skorpur og hrúðrar.

Til þess að hepta kláðasýki, er nauðsynlegt að hindra samgaungu sjúkra og heilbrigðra skepna svo sem unnt er, beita meðölum, sem drepa kláðalúsina og styðja að lækningunni með góðu viðurværi.

Sauðfjárláði er langtum áridameiri

enn kláði á öðrum húsdýrum, sem haldið er einstaklegar hverju fyrir sig, ekki eingaungu af því, að sauðfè gengur í hópum, og sótt næmfið á þannig hægra með að grípa um sig, heldur líka sökum þess, að hann rírir ullina bæði að vöxtum og gæðum, auk þess sem hann dregur bæði úr mjólk og kjöti.

Orsakir sýkinnar. Sauðfè í öllum löndum og af öllum tegundum er meðtækilegt fyrir kláða; en þó virðist það einkum eiga sér stað með fè það, sem hefir smágjörva ull (finuldede Faar), Kaldt og vott haglendi, sérflagi þar sem jörð er ófrjóf og óræktuð, eru kríngumstæður, sem auðveldast koma honum á stað. Hafi einhver sauðahjörð um lengri tíma haft litla og vonda sæðu, t. d. skemmt hey, og sè henni þar að auki þrýst saman í heit, dymm, rakasöm og óhrein hús, sem vanta loptsúg, eptir að

hún að haustinu hefir orðið að þola kulda og votviðri og þess vegna er orðin mögur og innanveik, þá eru allar lífskringumstæður sjáris hinar hagkvæmustu fyrir þroska og útbreiðslu sýkinnar.

Þeir sjúkdóms-vessar, sem slá út úr dýrinu undir þessum kringumstæðum, gefa hláðalúsinni ríkuglega næringu, og styðja freklega að tíngun hennar; og sð kláðasýkin þannig uppkomin á þvílsku sè, breiðist hún auðveldlega út frá einni skepnu til annarar fyrir sóttnæmi, og frá hjörð til hjarðar, ef henni eru engin takmörk sett með lækningatilraunum. Við þessu er ekki nærri eins hætt, þar sem sauðfè er vel haldið með fóðri og við góða krapta, því þá stendur það lengi móti sóttnæminu, og getur þvílsku sè batnað jafnvel af sjálfu sèr, þó sýkin komi upp meðal þess, ellegar hún lætur auðveldlega undan lækningatilraunum,



Lífkamsbyggíngin (Organismen) verst því, undir svo heppilegum kringumstæðum, miklu betur fyrir útbreiðslu sýkinnar, og þarf ekki að kvíða því, að kláðinn brjótist aptur út á þvílíkri hjörð, nema hann komi fyrir sóttnæmi; en þar sóttnæmi getur útbreiðst á margan hátt, t. d. með skinnnum og ullu af kláðafè, og ein kláðakind getur mengað heila hjörð, blýtur sérhverr bóndi í þessu tilliti að veita fè sínu hina nákvæmustu eptirtekt. Fjárkláðalúsin, sem, eins og að framan er un getið, er hin næsta orsök sýkinnar, getur sjest með berum augnum; hún er gljáandi, hvít, næstum hnöttótt, og hefir opt liðótta riðleita fætur, útbúna með festiblöðkum (Hefteblade) en sumstaðar með hárum, og má sjá þetta í góðu stækkunargleri.

Kennimerki. Hin fyrstu kláðamerki í hjörðinni eru þau, að dýrin núá sér upp

við girðingar, jötur, steina, moldarbakka og þesskonar uppstandandi hluti, eða þau klóra sér með hornum, tönnum eða klaufum, og óhreinka ullina á seinastnefndan hátt. Sè þeim klórað, láta þau ánægju sína í ljósi með því að bæra varirnar, stappa fótum, og teygja höfuðið fram og aftur. Þegar dýrið klórar sér, losna fleiri ullarlagðar á því og standa útúr yfirborði ullarkápunnar; eru þeir að lit optast ljósleitari enn kápan sjálf. Til þess að vera þess fullviss, að sýkin sè kláði, en ekki annar hörundsúteláttur, þarf nákvæmlega að rannsaka dýrin. Skal þá taka húðina milli fínganna á þeim stöðum, hvar þau klæar, og finnst þá í byrjun sjúkdómsins lítill takmarkaður hnútur, nokkuð harður og viðkvæmur, og í honum klæar dýrið ákaft. Þegar ullin er greidd sundur á þessum stað, finnast smáhnappar á baunarstærð og á þeim blöðrumyndaðar ból-

ur fullar af hvítum eða optar bleikgulum vog, sem á veikluðum skepnum stundum hefir grænleitan blæ. Sèu bólurnar sprungnar, sem ekki lifur á laungu, finnast í stað þeirra smáskorpur. Í kríngum hnappana finnast nú kláðalýsnar, og sýna þær sig á rauðri húðinni sem litlir hvítir hnettir. Þar sem fleiri lýs eru, síðrar húðina af stíngjum þeirra, og verður hún þá þakin smáblöðrum, sem í fyrstunni eru fullar af vessa líkum eggjahvítu, er bráðum verður að útliti sem gröftur. Þessar blöðrur springa á stuttum tíma, og holdrosinn, sem við það missir hárraminu, heldur áfram að gefa frá sér þunnan gröft, sem er fæða lúsarinnar á meðan hann er fljótandi, en þegar hann storknar og er orðinn að þurri skorpu, flytur lúsin sig á hina næst liggjandi heilbrigðu húð. Á þenna hátt koma fram skorpurnar, og geta þær orðið töluverðt þykkvar og stórar

um sig og ýmislegar að útliti, því stundum eru þær gulleitar, stundum gráhvítar, stundum þunnar og harðar, stundum þykkvar og línar, og liggja þá stundum undir þeim kýli, sem brjótast út. og gefa frá sér nokkuð þykkar optast gulleitan gröft. Þunnar eru skorpurnar sérílagi á mögru fê, en hinar þykkri koma helst fyrir á feitum og kröptugum skepnum; en að öðru leyti á veðurátta, fjárkyn og kynferði einnig nokkurn þátt að þessu. Undir skorpunum eru sárafletirnir stundum samanhángandi og minni um sig, allt eptir eðli kláðans, og verður opt húðin á kláðastöðunum langtum þykkri og stinnari enn á heilbrigðum skepnum, en sú breyting fer smátt og smátt þegar kláðinn er læknaður.

Þeir staðir, sem kláðinn venjulega sýnir sig fyrst á, er herðakamburinn, lærin og hríggurinn, þó ber það ekki sjaldan við, að

hann kemur fyrst aptan í lærin og fyrir framan júfrið.

Þegar kláðinn eykst óðum, sèr í lagi á haust og vetur, missa dýrin opt talsverða leppa úr kápunni, og er þetta optastnær það, er gjörir eiganda varan við, að sýkin er komin í hjörð hans, þar sauðsè um þetta leyti árs almennt er haft við hús.

Framferði sýkinnar. Skepnan getur verið með kláða um lengri tíma, án þess tekið verði eptir nokkurri sèrlegri verkun á vellöðun dýrsins, en ef sýkin er látin sjálf-ráð, getur hún breidd sig út frá hinum veiku stöðum yfir mestallan kroppinn, jafnvel til fótanna og klaufanna. Sè sýkinni svo langt komið, gefur sú breyting, sem húðin og kirtlarnir undir henni lida, er þau þykkna og harðna, og hin iðuglega óværd, sem kláðinn verkar, tillesni til óþrifa og máttleysis, sem verður að lúgnaveiki, vatnssýki

og öðram innanmeinum og endar með dauða skepnunnar.

Meðferð sýkinnar. Einkar árfæandi í meðferð fjárkláðans er gott viðurværi (diætetisk Pleie), því það stendur á móti útbreiðslu sýkinnar, lættir lækningu hennar og varnar því, að hún komi aptur af sjálfri sér. Til að koma í veg fyrir að sýkin breiðist út í hjörðunum, verður að aðskilja sjúkt og heilbrigðt fè, og á þeim árstímum, sem fè gengur úti, hlífa því sem framast er unnt við þeim kríngumstæðum, sem helst styðja að viðgáangi og útbreiðslu kláðans, nefnilega votu og súru haglendi, miklum rigningum og kulda; verður, þegar svo stendur á, og kríngumstæður leyfa, helst að halda því við gjöf. Hvað ásigkomulag húsanna snertir, hljóta þau að vera mátulega stór, fyrir fjárfjölda þann, er í þeim skal byrgja, og eiga þau þarhjá að hafa nægan loptsúg og

birtu. Sè gömul hús notuð, sem sjúkt fè hefir í verið, verður að hreinsa þau vandlega með þeim meðölum, sem áreiðanlegt er að drepa kláðalúsina, svo sem með því að sviða húsin að innan t. d. með heyi, svo að loginn nái nógu langt upp eptir veggjunum. Allt trækyns skal annaðhvort tjarga, áðurenn það er aptur brúkað, eður draga yfir það uppleyst kalk, þvo það í brennheitri öskulút, eða uppleystu klórkalki (1 ½ af klórkalki í 6 pottum vatns). Gildir slík hreinsun ekki einungis sjárhús, heldur líka kvíar, bæði fastar og færirkvíar, skal sviða hinar föstu sem húsin, en færirkvíar flytja úr stað og meðhöndla sem áður segir um húsviðu. Það, sem enn fremur er sérlega hættulegt fyrir útbreiðslu sótt næmisins og þarf varkárlegrar meðferðar, er skinn og ull af kláðafè; skal þetta, strax sem það er tekið af dýrinnu, leggja í sterka öskulút í 2

daga. Á öskuna sè hellt vatni sjóðanda, og látið standa sólarhring; þá er askan síuð frá og skinnin lögð í lútina hreina. Sè hið walziska kláðameðal fyrir hendi, má leggja bæði ull og skinn í það, og þarí þá ekki áð óttast tyrir útbreiðslu sóttæmisins af þeim hlutum.

Lækning kláðasýkinnar útheimtir meðöl, sem megna að drepa kláðalúsina, og er það hinn verulegasti og öldungis nauðsynlegur skilmáli fyrir lækningu hennar. Af þeim meðölum, sem bæði eru megnug um að stöðva sýkina, og þar hjá kosta lítið, eru andveld meðferðar og ekki hættuleg fyrir heilbrigði dýranna yfir höfuð, ber að taka fram þessi:

Hið walziska kláðameðal, sem, vel til búíð og eins og það nú sæst á lyfjabúðinni hefir um lánga áraröð sýnt sig sem sérlega gott meðal til að lækna kláðann,



hreinsa háðina fyrir væringu, án þess að hafa neina skaðlega verkun á dýrin eða ullina, sem einmitt vex en rírnar ekki við það, ber sér í lagi að nefna, þegar kríngumstæðurnar heimta, að fè sè baðað í allri ullu, og ber það því fremur að tilgreina, sem það er svo ódýrt, að þó næstum þursi tvöfalda af því, þegar baðað er í alullu, getur það þó engan veginn heitið kostnaðarsamt.

Meðalið er samsett af þessum pörtum:  
af frísku brendu (stein-)kalki 4  $\mathfrak{R}$ , eða

- vættu kalki . . . . . 12  $\mathfrak{R}$

- pottöskù . . . . . 5  $\mathfrak{R}$

- tjöru . . . . . 4  $\mathfrak{R}$

- hjartarhornsölu . . . . . 6  $\mathfrak{R}$

þetta skal því næst þynna með kúahlendi . . . . . 100 pottum

vatni . . . . . 400 —

Þetta verður nægilegt það handa 500 rúins fjár, en að eins handa 300 í alullu.

5 & 6 lóð af meðalínu, eins og það fæst á lyfjabúðinni, skal þynna með 20 pottum kúahlands og 80 pottum vatns, og nægir það það fyrir 100 rúins fjár, en 60 í alullu. Sem nauðsynlegan skilmála fyrir því, að baðið hafi áreiðanlega verkun, verður að taka fram, að allar skorpur sé vel bleyttar upp, annaðhvort með grænsápu, eða með smýrslum af jöfnum pörtum terpentínolíu, tjöru og grænsápu, sem borin er á 2 eða 3 dögum áður baðað sé; í baðinu skal nú á vel þá staði, sem á hefir verið borið, og sé skorpurnar þykkar og fastar, má brúka sljóft verkfæri til að rísa þær upp og ná þeim burt.

Hin Tessíersku böð eru eflaust hin kröptugustu og áreiðanlegustu kláðamedöl, sem vér höfum ráð á, en þar brúkun þeirra

við sauðfél í alullu er miður hagkvæm sök-  
um þess, að ullin verður af þeim gul og  
snörp, ætlum vèr að það meðal ætti ekki  
við að hafa fyrri enn að vorinu, þegar fé  
er farið úr ullu, því síður sem hið sjúka  
fé nú í haust og á komanda vetri mundi  
þola það vel. Meðalið er tilbúið af

Arseniki . . . . 4 ℥

Járnvitrióli . . . . 40 ℥

Járntveiltis . . . .  $1\frac{1}{5}$  ℥

mulinni Gentianrót  $\frac{1}{6}$  ℥

af þessari samsetningu takast 23 ℥ til 100  
potta af vatni, og er það sodið í 8—10  
mínútur, og er þá meðalið brúkað á sama  
hátt sem hið walziska, með þeirri undan-  
tekníngu, að júlfríð verður að maka með  
feiti, áður baðað sè, til að koma í veg fyr-  
ir afrisur (Irritation) þær, sem það annars  
verkar á hinna þunnu og smágjörvu húð.  
Varkárni ræður til, að þeir sem baða, einn-

ig maki höndur sínar í feiti. Þessum böðum hefir með mestu heppni verið beitt við gamlan inngróinn kláða, og skal hér geta mikilsfengrar tilraunar, er þeir gjörðu prófessor Delafond og doktor Bourguignon.

36000 fjár á ýmsum aldri og af ýmsu kynferði var þvegið í þessum legi, og urðu 35,963 kindur á stuttum tíma albata og sýktust ekki aptur, en 37 dóu af tæringu og öðrum innan meinum, en engin kind af sjálfu þaðinu.

Hið arseníksúra kalí, sem fyrst nýlega er komið í tíðkun, má einnig nefna sem ágætt meðal við allsnakið fê, þegar það verður núld vel inn í húðina, en lukkast torveldlega þegar fê er í ullu. Meðalið skal tilbúið á lyfjabúðinni, eins og hin áðurnefndu, og er samsett af

Arseníki 2 pörtum

pottösku 1 parti.

er þetta söðið í svo miklu af vatni, sem það getur vel runnið í. Blandan er nú of sterk, og verður því að þynna hana, áður brúkuð sè, með svo miklu af vatni, sem læknisávisanin (Recepten) tiltekur.

Kláðasmyrslin, sem einúgis eru ætluð til að maka kláðastadina með, eru að mestu leyti samansett af sömu efnum sem legirnir (orm- eða lúsdrepandi meðöl); en þar brúkun þeirra er yfirgripsmiðni enn lauganna, meiga þau, án þess að verða dýrunum að meini, vera langtum sterkari (efnum þeirra minna dreift) enn böðin, enda hafa þau optast í sèr efni, sem bleyta og uppleysa kláðahrúðrin. Hafi þau ekki í sèr þvísík efni, verður fyrst að uppleysa hrúðrin t. d. með grænsápu, eptir það búið er að ná af þeim ullinni; verður verkan þeirra þannig áreiðanlegri og kröptugri. Meðal hinna mörgu kláðasmyrsla skal hær nefna

þau, sem í öllu tilliti má álíta hagfeldust  
og sem reynslan hefir borið vitni um;

Nr. 1. Tak: terpentínölfu 1 part

tjöru . . . 1 —

grænsápu . 1 —

blanda saman yfir hægri glóð; hin þannig  
tilbúnu smyrslu eru sæmilega língerð, hægt  
að koma þeim við, og læsa þau sig fljótt  
inn í hrúðrin.

Nr. 2. Abildgaards og Viborgs kláðasmyrslu

Tak: brennisteinsblóm 3 parta

hampölfu . . 16 —

hrær í þessu yfir eldi uns brennisteinninn  
er uppleystur, og lát svo þar í

mulið álún 3 parta

terpentínölfu 1 —

hrær svo í, uns kaldt er.

Nr. 3. Tak: hjartarhornsolfu 1 part

tjöru . . . 1 —

grænsápu . . . 2 parta  
hrær saman yfir hægum eldi.

Nr. 4. Vandels kláðasmyrli.

Tak: tjöru . . . 2 parta  
saltað smjör 1 —  
pottösku . . . 1 —

tjaran og smjörið bræðist saman; þá er  
pottaskan í látin og hært í uns kaldt er.

Nr. 5. Tak: terpentínolífu 1 part  
nýtt smjör 1 —

þegar kláðinn er votur, þá lát í 1 ℔ af þessu  
1 lóð af muldum blásteini  
sem hrærist vel saman við hitt efnið.

Nr. 6. Tak: grænsápu . . . 2 parta  
tjöru . . . . . 1 —  
gljáandi sót (runnið sót) 1 —

hrær vel saman yfir eldi.

Nr. 7. Tóbaksseyði við kláða

Tak; almennilegt tóbak 1 ℔  
vatn . . . . . 9 potta

lát sjóða niður um þriðjúng, lát svo í hvern pott 4 lóð af blásteini.

Hvert fyrir sig af framan nefndum smyrslum getur brúkast eptir því sem kríngumstæðurnar leyfa; þó viljum vér helst mæla fram með smyrslunum Nr. 1., er hafa reynzt ágætt og kröptugt meðal.

Böðunnaraðferðin. Svo að hægt verði að baða án þess að ofmikið fari til spillis af lauginni, verður baðkerhaldið að vera mátulega stórt og vel lagað. Lengd þess má vera 7 kvartil, breiddin að ofan 5 kvartil, í botninum þar á móti 3 kvartil, dýptin 5 kvartil. Kerhald það, sem dýrin eru látin í, þegar þau koma úr baðinu, skal vera líkt að stærð, en þarf ekki að vera eins djúpt.

Ef baðkeröld vanta, má vel nota bát, ef fyrir hendi er. Báturinn sè reistur nokkuð í annan endan, svo að laugin safn-



ist í hinn, og nú framfer böðunin þannig: Fönu sè haldið í hóp nálægt baðkerhaldinu, taki svo tveir menn hverja skepnu, annar um höfuð og framsætur, hinn um malir og aptursætur, og dýfi henni með bakið niður á við, svo djúpt í baðkerbaldið, að höfuðið eitt standi upp úr lauginni, svo að lögurinn ekki skaði eyru, nasir eða augu. Meðan baðað er, skal núna skorpurnar, uns meðalið gengur gegnum þær, og falla þær þá auðveldlega af. Þegar þetta er búið, er kindin látin yfir í hið tóma kerhald og skal þar í renna lút sú er í ullinni hángir, og kreystir maður ullina upp við kropp dýrsins. Sè bátur brúkaður, færast skepnan úr baðinu upp í hærri enda hans og flýtur þá lútinn, sem undin er úr ullinni niður í neðri endann á bátnum. 6 manns geta á þenna hátt baðað 4—600 fjár á dag, 400 þegar það er í alullu, en 600 rúlns

fjár, og er lækningin auðveldari undir síðarnefndum kríngumstæðum. Bæðunin skal framfara, ef kostur er á, í góðu veðri, og böðin, sem eiga að vera volg, hafa þá fyrst fuilkomna verkun, en fæð hefir þá ekki illt af bæðinu. Ef veður er slæmt verður að láta skepnurnar í rúmigott hús til að þorna og er hér við enn fremur að athuga, að nóg hey sé breidt á gólfuð, og tekið burtu jafnótt og dignar, svo ekki standi af því óhollur daun og raki í húsinu.

Kláðafæ sé bæðað fyrst tvisvar með 8—10 daga millibili, og þegar 14 dagar eru liðnir frá öðru bæði, skal rannsaka hjörðina nákvæmlega og finnast þá kláðabólur, skal bæða í 3. sinn. Að skepnurnar klóra sér, og að meira ber á hrúðrunum optir bæðið, er optast nær merki þess, að sýkin læknastr, en ekki, eins og menn hér almennt halda, röksemd fyrir því, að sýkin sé ó-

læknandi, því kláði sá, sem vart verður við nokkru eptir baðið kemur sumpart af fiðringi í húðinni sumpart af því, að ör eru að myndast af sárum þeim, er undir skorpunum voru. Að meira ber á hrúðrunum eptir baðið kemur af því að þær hafa losast við húðina og færst út í ullina.

Kjötið af kláðafè má borða, án skaða fyrir heilsuna, ef skepnan var ekki útsteypt yfir mestallan kroppinn, og ekki orðin skínhoruð, því undir þessum kríngumstæðum skyldi það ekki hafa til manneldis.

Reykjavík, 14. október 1857.







Lbs - Islandssafn



100352707 - 9

